

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Abonnement annuel :

170 F.

ÉDITION - GRANDES CULTURES

ISSN 0295-5776

- 1 -

BULLETIN n° 14 du 12 JUIN 1987

BLE	: - Situation maladies et pucerons.
ORGE de PRINTEMPS	: - Surveiller l'oïdium.
BETTERAVE	: - Surveiller les parcelles tardives.
POIS	: - Situation tordeuses. - Premiers symptômes d'antracnose.
TOURNESOL	: - Nécroses sur feuilles.
POMME de TERRE	: - Mildiou.
COLZA	: - Alternaria.

TELEMATIQUE : 36.15 tapez CLACMAG

BLE

Stade épiaison à défloraison selon les dates de semis.

SITUATION :

Maladies :

Septoriose peu active, oïdium atteignant parfois les dernières feuilles dans les parcelles non protégées.

Présence d'*helminthosporium tritici* repentis très localement (Hte Marne).

La rouille brune évolue peu dans les quelques parcelles touchées.

Insectes :

Quelques colonies de pucerons (*Sitobion avenae*) sont signalées. La météo ne leur est pas favorable.

PRECONISATION :

La couverture des épis est à réaliser rapidement, si ce n'est déjà fait.

L'emploi de fongicides systémiques présente peu d'intérêt sur les parcelles en cours de floraison.

Ne pas intervenir contre les pucerons.

ORGE de PRINTEMPS

Début gonflement dans les parcelles précoces.

SITUATION :

Présence d'oïdium, plus rarement de rhynchosporiose et d'*helminthosporiose*.

PRECONISATION :

Assurer une protection au stade gonflement. Référez-vous au dépliant vert ITCF.SPV.INRA pour le choix des produits.

BETTERAVE

Stade 4 à 10 feuilles.

Des colonies de pucerons noirs sont toujours présentes dans les cultures.

Nous vous rappelons que la betterave est moins sensible à ce ravageur à partir du stade 8 feuilles.

POIS

Tordeuses

SITUATION :

Après le pic des captures des 1er et 2 juin, le vol a très nettement diminué. Les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables à une reprise notoire du vol.

Lieux	Captures cumulées au 10/06
Mazagran (08)	124
Mergey (10)	26
Pouan les Vallées (10)	9
Planty (10)	18
Charny le Bachot (10)	1
Songy (51)	31
Corbeil (51)	22
Sémilly (52)	0

PRECONISATION :

Ne traiter au stade gousse plate du 2e niveau florifère que lorsque le cumul des 200 captures est atteint.

Anthracnose

SITUATION

Dans quelques parcelles, on observe les premiers symptômes d'anthracnose sur les feuilles basses.

PRECONISATION :

Effectuer un premier traitement si vous observez des taches circulaires claires, bordées d'un liseré brun, avec présence au centre de points noirs (pycnides).

Attention ne pas confondre avec les taches de bactériose (pas de points noirs).

Bactériose :

Les symptômes sont toujours très visibles sur les feuilles et pétioles,

parfois sur les tiges et les vrilles mais restent localisés sur les étages inférieurs. Ils sont provoqués par une bactérie du genre *Pseudomonas*. Le développement de la maladie est lié aux conditions météorologiques et particulièrement à l'humidité.

Symptômes caractéristiques : taches de couleur brun violacé en forme d'étoile apparaissant souvent au niveau du stipule ; elles ont un aspect souvent huileux.

PRECONISATION :

Il n'existe pas de lutte chimique.

TOURNESOL

Stade 2 à 6 paires de feuilles.

De nombreuses taches nécrotiques sont visibles dans la majorité des parcelles depuis le 8 juin. Ces symptômes sont dus aux "coups de vent" de dimanche.

POMME de TERRE

Mildiou

SITUATION :

Très peu de contaminations enregistrées depuis le début du mois de juin compte tenu des températures fraîches.

Secteurs	Contaminations théoriques
Reims	3/06
Euvy	3 et 4/06
Marson	7/06
Bussy-Lettrée	7/06
Châlons/Marne	5-6 et 7/06

PRECONISATION :

Ne renouveler le traitement que si plus de 20 mm de pluie cumulés.

COLZA

SITUATION :

L'*alternaria* évolue peu et les attaques sont généralement faibles.

PRECONISATION :

Visitez les parcelles n'ayant reçu aucune protection fongicide. Un traitement ne se justifie qu'en cas de présence de la maladie sur les siliques ou les feuilles les plus hautes.